

RIKSINVENTERINGEN AV BERGUV 2009

Bakgrund

Under 2009 kommer berguven inventeras i Sverige i regi av SOF med hjälp av berguvsgrupperna. Berguven har under de senaste åren konstaterats minskat i flera områden utan egentliga förklaringar. I flera andra områden är artens status oklar. Osäkerheten om läget för berguven gör det motiverat med nu aktuell riksinventering.

Sedan många år tillbaka sker regelbundna inventeringar på flera håll i landet. Önskan är att intensifiera dessa arbeten under 2009 och inkludera även övriga områden med ofullständig teckning. Årets riksinventeringen ska i första hand sträva efter att räkna antalet revirhävdande uvar och eller uvar, som är trogna ett revir/område.

Rapportering

Rapportera in fynd via Svalan eller skriftligt till regionala rapportkommittén eller till kontaktperson inom de regionala berguvsprojekten där sådan är utsedd. Rapport via Svalan skall alltid när det gäller revir eller häckning av berguv rapporteras så att observationen blir dold eller bara visas på en 25 X 25 km. Gör så här vid rapport till svalan: Ange lokal, ange något av häckningskriterierna 2 – 20 då visas bara en storruta på 25 x 25 km på nätet. Om rutan "Dölj informationen" kryssas för döljs hela observationen och den syns ej på nätet.

Uppgifterna från inventeringen samlas in regionvis av SOF:s ordinarie regionala rapportkommittéer i samarbete med någon från de regionala berguvsgrupperna där sådana finns eller annan person är utsedd. Conny Philipsson är nationell samordnare för inventeringarna och de regionala rapporterna sänds till honom.

Manual till inventeraren

Då uppgifterna av årets inventering ska jämföras med resultat från tidigare riksinventeringar, är det av vikt att försöka genomföra inventeringen på likartat sätt. De rekommendationer som följer nedan är i stort jämförbara med tidigare riksinventeringar. Berguven är en svårinventerad art. Det är inte möjligt att totalinventera arten, men vi hoppas med gemensamma krafter kunna skaffa oss en så bra bild av läget som möjligt i landet.

Följande bör beaktas:

- ◆ Varje potentiell lokal bör besökas minst två helst tre gånger om inte kontakt med uv fås vid första tillfället.
- ◆ I södra Sverige utförs inventeringar lämpligen under perioden februari till mars. I norra Sverige kan inventeringen pågå något längre.
- ◆ I första hand ska permanenta revir inom samma områden som inventerats tidigare år besökas. Som permanent revir räknas en uv som hävdad revir under en minst en månads tid.
- ◆ Inventeringen ska i första hand räkna antalet revirhävdande uvar och eller uvar, som är trogna ett revir/område. Uppgifter om kringstrykande uvar är mindre viktiga, men ska ändå noteras.
- ◆ Att leta boplatser eftersträvas primärt inte i denna undersökning. Det kan vara svårt och är ofta tidskrävande. Dessutom är berguven störningskänslig under häckperioden.
- ◆ Var medveten om att berguven ibland etablerar sig på lokaler som traditionellt inte uppfattas som typiska uvlokaler. Uven kan även häcka i ren skogsterräng

utan klippbranter (både barr- och lövskog), på hyggen, i jaktorn, på byggnader i industriområden, i soptippsmiljöer, i stenbrott, i rovfågelbon, i hålträd, i trädglykor, uppe på stora stenar i åkerholmar m.m.

- ◆ Observera att etablerade par ger ofta få läten ifrån sig, vissa kvällar ingenting. Bäst är att lyssna strax efter solnedgången. Gryningen kan också ge resultat.
- ◆ Uvhanar utan honor kan ropa intensivt och länge under hela natten. På de ställen där du fått kontakt med uv under vinter/vårvinter, gör uppföljande besök under april - maj för att konstatera om det är en ensam revirhållande uv eller ett par. Många vilda uvar påbörjar ruvningen i mitten av mars, i södra Sverige vissa år ännu tidigare.
- ◆ Följ upp med besök i början av juni om du inte tidigare säkert konstaterat häckning. Leta då efter varnande föräldrar. Vid besök inom reviret hörs ett enstavigt, dovt och kort "ho" från hanen. Har du kommit nära boet, kan honan visa sig, spela skadad, ge ifrån tysta gnisslanden eller serier av skarpa kveckanden. Varningshoanden mitt på dagen indikerar alltid häckning.
- ◆ I juli, när ungarna är flygga men fortfarande kvar i reviret kan boplatsen eftersökas.
- ◆ Hittar du spybollar och ruggade uvfjädrar i terrängen samt stora "skitblaffor", ofta på upphöjda platser, är det goda indikationer på aktivt revir.
- ◆ För att minimera störning organisera med andra inventerare i samma områden eller angränsande kommun/område för att undvika dubbelbesök. Undvik att gå närmare än 100 meter från känd boplats.
- ◆ Ge akt på sådant som kan indikera störning eller förföljelse. Sprid inte kunskap om häckningar annat än där så är motiverat.
- ◆ Samtliga iakttagelser rapporteras till rrk el. lokal regional kontaktperson.

För ytterligare frågor om riksinventeringen vänligen kontakta:

Conny Philipsson
Polhemsgatan 16
371 40 KARLSKRONA
0455 / 812 88
filip.cph@tele2.se